


UNIwersytet Jagielloński
Instytut Geografii
Urząd Miasta Krakowa
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Komisja Kartograficzna

Materiały
Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych
Tom 17

KARTOGRAFIA MIEJSKA

XXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
Kraków, 10–11 listopada 1995




Kraków 1997



RÓŻNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA DANYCH PUNKTOWYCH ZGROMADZONYCH W WARSTWACH „WROCŁAWSKIEJ BAZY DANYCH TEMATYCZNYCH”

Wrocławska Baza Danych Tematycznych została opracowana na zlecenie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w latach 1991–1992.


Jako organizację systemu pól odniesień przyjęto [1] rozwiązanie modułowe, z czterema poziomami podziału, według jednostkowego pola odniesienia, stanowiącego w Polsce utworzony przez siatkę geograficzną trapez o wymiarach 5' × 10' (ryc.1).



Ryc. 1. Rozmieszczenie pól pierwszego rzędu dla bazy WBTD

W nawiązaniu do systemu TEMKART początkiem układu sieci pól jest punkt o współrzędnych: $B = 55^\circ$, $L = 14^\circ$. Numeryczny kod identyfikacyjny pola

I rzędu (ryc. 2), składa się z numeru pasa (01–72 Pn. → Pd.), słupa (01–61 Zach. → Wsch.), kodowanie następnego rzędu odbywa się według analogicznej reguły (pas 0–9, słup 01–12), a dalszych – zgodnie z wewnętrznym podziałem ćwiartkowym. Taki sposób podziału miał na celu uzyskanie pola podstawowego o powierzchni 1 km², którego narożniki stanowią punkty o współrzędnych geograficznych, umożliwiającym umiejscowienie pola na każdej mapie (bezpośrednio, gdy istnieje tam dokładna siatka geograficzna lub pośrednio po odpowiednim przeliczeniu współrzędnych narożników). Teren Wrocławia zajmu-



Ryc. 2. Sposób organizacji pól i kodów w bazie WBDT

